

Eristale des fleurs (*Myathropa florea*)



L'Eristale des fleurs est une espèce très courante en Picardie, que l'on retrouve dans une grande variété de milieux, butinant les fleurs ou simplement posée au soleil. Les larves sont détritivores et se trouvent généralement dans les cavités d'eau stagnante des vieux arbres.



10 à 14mm

Famille : Syrphidae



HABITAT

Présent dans toute l'Europe, ce syrph se rencontre principalement à proximité de la végétation arborée. Il sera visible sur les fleurs, le long des lisières forestières, dans les clairières et milieux bocagers.



PHENOLOGIE


Les adultes volent entre avril et octobre, avec un pic entre juillet et août.




IDENTIFICATION

L'espèce est facilement reconnaissable aux tâches caractéristiques de son thorax, qui évoquent une tête de mort ou le symbole en forme de chauve-souris de « Batman ».

Il est difficile de la confondre avec une autre espèce, à moins que ces tâches ne soient peu marquées (dans ce cas, confusion possible avec d'autres éristales). Les yeux des mâles se touchent, tandis que ceux des femelles sont séparés.



- 645 observations
- 259 communes
- 142 observateurs
- Première observation 2004
- Dernière observation 2024



Si vous observez cette espèce, n'oubliez pas de renseigner votre observation dans la base de données <https://clicnat.fr/>