

Graphomyie tachetée

(*Graphomya maculata*)



La Graphomyie tachetée est commune dans les milieux ouverts et peut s'observer partout en Picardie. Elle se distingue assez aisément des autres mouches par ses ornements. Elle pond ses oeufs dans la litière du sol et ses larves chassent d'autres larves de diptères pour se nourrir.



6 à 9 mm

Famille : Muscidae

Femelle

thorax gris à
lignes noires




Mâle

triangle noir sur
le scutellum

yeux
velus

tâches noires
sur l'abdomen



HABITAT


Cette mouche apprécie les fleurs d'ombellifères comme la berce commune. Elle s'observe dans les milieux ouverts comme les prairies, les friches, les coteaux calcaires et les lisières forestières bien exposées.

PHENOLOGIE

L'espèce est surtout visible durant la saison estivale, en juillet et août à l'état d'imago.

IDENTIFICATION

Le mâle et la femelle sont différents, notamment au niveau de la coloration de l'abdomen. Le mâle, en plus d'avoir les yeux rapprochés, a l'abdomen orangé, taché de noir. Pour la femelle, son abdomen est grisâtre, taché de noir. Le thorax et le scutellum sont très caractéristiques et permettent généralement de reconnaître facilement l'espèce, surtout lorsqu'il s'agit d'une femelle.



183
observations

69
communes

66
observateurs

Première
observation
2009

Dernière
observation
2024



Si vous observez cette espèce, n'oubliez pas de renseigner votre observation dans la base de données <https://clicnat.fr/>