

Alophore hémiptère (*Phasia hemiptera*)




L'Alophore hémiptère est une mouche faisant partie de la famille des Tachinidae, qui parasite de nombreux insectes. La femelle de cette espèce pond ses œufs sur des punaises, comme les Pentatomidae, et les larves s'en nourrissent. Adultes, le mâle et la femelle sont très différents et peuvent être pris pour deux espèces distinctes.



8 à 11 mm

Famille : Tachinidae



HABITAT

Cette tachinaire s'observe dans différents milieux comme les friches thermophiles, les lisières et clairières forestières ou encore les coteaux calcaires. Elle butine souvent les Ombellifères, comme les berces.



PHENOLOGIE


Dans notre région, l'espèce ne semble faire qu'une seule génération par an et s'observe surtout durant les mois de juillet et août.



IDENTIFICATION

Le mâle et la femelle ont un dimorphisme sexuel très accentué. Le mâle a des ailes plus larges et colorées que la femelle. L'espèce a pour caractéristique d'avoir les côtés du thorax avec des poils roux/doré, ce qui permet de la séparer des autres espèces de *Phasia*, notamment de *Phasia aurigera*.

Ectophasia crassipennis est très proche mais s'en distingue au niveau des ailes, avec la cellule r4+5 qui est fermée chez le genre *Phasia*.



Comparatif avec d'autres espèces :



pilosité orangée
sur les pleures

Phasia hemiptera



pilosité sombre
sur les pleures

Phasia aurigera



Il existe d'autres espèces de *Phasia* comme *Phasia obesa* en région mais c'est *Phasia aurigera* qui est vraiment la plus proche de *Phasia hemiptera*.

cellule r4+5
fermée



Nervation alaire
du genre *Phasia*

cellule r4+5
ouverte



Nervation alaire
du genre *Ectophasia*

